



Materiały edukacyjne – zalecenia pielęgniarские dla pacjenta przy wypisie ze szpitala – **załącznik nr 43**

Zalecenia dla pacjenta po zabiegu operacyjnym guza przysadki mózgowej z dojścia przezczaszkowego

Rana pooperacyjna

1. Jeżeli przy wypisie szwy nie zostały usunięte:

- w czasie wykonywania toalety ciała należy zadbać o to, by nie zamoczyć opatrunku!!!
- opatrunek należy zmieniać co 3 dni oraz w momencie gdy się zabrudzi bądź zamoczy podczas kąpieli,

Pamiętaj przed przystąpieniem do zmiany opatrunku:

- dokładnie umyj ręce wodą i mydłem oraz zastosuj środek dezynfekcyjny,
- podczas zmiany opatrunku zachowaj zasady dezynfekcji rany –dezynfekuj zawsze od środka na zewnątrz, używając tylko sterylnego gazika nasączonego środkiem dezynfekcyjnym (np. **Octenisept**),
- na zdezynfekowaną ranę nałóż jałowy, suchy opatrunek (np. **Elastopor**), uważaj aby nie dotykać wewnętrznej części opatrunku przylegającego do rany,
- zdjęcia szwów dokonaj w terminie zaleconym przez lekarza w poradni specjalistycznej.

2. Jeżeli przy wypisie szwy zostały usunięte:

- opatrunek należy utrzymać przez okres około 3 dni,
- opatrunek może nie utrzymywać się na głowie z powodu np.: odrastania włosów, wówczas wymień go, ale zachowaj zasady jak w pkt 1,
- jeżeli po trzech dniach rana nie wygoiła się, utrzymaj jałowy, suchy opatrunek do czasu jej wygojenia.

WAŻNE!

Jeżeli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej objawów:

- ucieplenie skóry wokół rany,
- zaczerwienienie,
- obrzęk w obrębie rany,
- ból,
- wyciek z rany, nieprzyjemny zapach,
- gorączka - **niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.**

Pielęgnacja skóry głowy

- po 3 dniach od zdjęcia szwów można umyć głowę, letnią wodą, szamponem bezzapachowym hipoalergicznym,
- podczas kąpieli należy pamiętać aby strumień wody nie był skierowany bezpośrednio na ranę,



- przez okres kilku miesięcy od operacji warto bliznę pooperacyjną chronić przed działaniem promieni UV (słońce), np.: poprzez osłanianie delikatnym, przewiewnym nakryciem głowy z naturalnych tkanin.

Zasady postępowania w warunkach domowych po operacji guza przysadki mózgowej

- unikaj gwałtownego pochylania się, jeśli musisz się pochylić utrzymuj proste plecy, przykucznij zginając kolana i stawy biodrowe,
- unikaj gwałtownych ruchów głową -wszelkie czynności, takie jak np. ubieranie się, zmiana pozycji, wstawanie z łóżka czy krzesła wykonuj powoli,
- unikaj nałogów i używek,
- zadbaj o odpowiednie warunki domowe: usuń dywany, chodniki z ciągów komunikacyjnych, kubek umieść na wysokości wzroku, możesz także zamontować dodatkowe uchwyty w sanitariatach – takie działania mogą uchronić Cię przed upadkiem.

Informacje dodatkowe

- **obserwuj i kontroluj wzrok**, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zaburzeń wzrokowych skontaktuj się ze specjalistą,
- **obserwuj pojawienie się płynotoku (wodnisty wyciek z nosa**, może on występować w nocy dlatego sprawdzaj poduszkę po przepudzeniu)
- **obserwuj ilość wydalanego moczu**
- **każdy niepokojący objaw konsultuj z lekarzem prowadzącym.**

Opracowane na podstawie:

1. Walewska E., Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego, PZWL Warszawa 2010.
2. Szewczyk M.T., Ślusarz R., Pielęgniarstwo w neurochirurgii, Borgis 2006.